

## RINGKASAN

**Asuhan Gizi Klinik Penyakit Dalam Pasien Obstructive Bile Of Duct Di Ruang Rajawali 5 Rsup Dr. Kariadi Semarang**, Olivia Tarrega, NIM G42190361, 46 lembar, Tahun 2023, Program Studi Gizi Klinik, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, M. Rizal Permadi, S.Gz., M. Gizi (Dosen Pembimbing 1).

Obstruksi saluran kandung empedu atau koledokolitiasis merupakan penyumbatan yang disebabkan oleh batu empedu (Attara,2022). Batu empedu biasanya terbentuk di dalam kantung empedu, saluran empedu, dan saluran hati. Di Indonesia, prevalensi penyakit batu empedu lebih rendah daripada di negara Barat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang masyarakatnya sering mengeluhkan tentang penyakit batu empedu hingga dirawat di rumah sakit. Prevalensi penyakit batu empedu di Amerika Serikat mencapai 15% dan pasien yang ditemukan koledokolitiasis saat pembedahan yaitu 3-14,7%.

Berdasarkan pengkajian data antropometri, status gizi pasien kurang. Diagnosa gizi pada Tn. S diantaranya berkaitan dengan NI-2.1 Kurangnya asupan oral berkaitan dengan keadaan pasien merasa mual ditandai dengan asupan energi 52% dari kebutuhan. NC-3.1 Underweight berkaitan dengan kurangnya asupan energi ditandai dengan nilai percentile LILA 77% (Gizi Kurang). Pasien Tn. S setelah mendapatkan intervensi gizi tidak mengalami perbaikan.

