

# Pengaruh Substitusi Tepung Labu Kuning (Cucurbita moschata L) terhadap Nilai Gizi Brownies Kukus Labu Kuning

by Silvia Oktavia

---

**Submission date:** 18-Apr-2021 07:01AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1562048102

**File name:** 5.2570\_JII\_21-1\_Yani\_Subaktih.docx (32.34K)

**Word count:** 1828

**Character count:** 10695

**Yani Subtilah, Agung Wahyono, Silvia Oktavia Nur Yudiastuti, Qurrota A'yun Mahros.** Pengaruh Substitusi Tepung Labu Kuning (*Cucurbita moschata L*) terhadap Nilai Gizi Brownies Kukus Labu Kuning

# 1 Pengaruh Substitusi Tepung Labu Kuning (*Cucurbita moschata L*) terhadap Nilai Gizi Brownies Kukus Labu Kuning

## Effect of Pumpkin Flour Substitution (*Cucurbita Moschata L*) on the Nutritional Value of Steamed Pumpkin Brownies

Yani Subaktih<sup>#1</sup>, Agung Wahyono<sup>\*2</sup>, Silvia Oktavia Nur Yudiastuti<sup>3</sup>, Qurrota A'yun Mahros<sup>4</sup>

<sup>#</sup>Program Studi Teknologi Industri Pangan, Politeknik Negeri Jember,

Jl. Mastrip PO. Box 164 Jember, Indonesia

<sup>1</sup>Email: silvia.oktavia@polije.ac.id

<sup>\*</sup>Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, Politeknik Negeri Jember,

Jl. Mastrip PO. Box 164 Jember, Indonesia

### *Abstract*

Pumpkin is one of an agricultural commodity which is rich in nutrients. Pumpkin also has high vitamin and mineral contents including betacarotene, vitamin C and vitamin B1. Pumpkin flour is suitable to be added into food products in order to increase the nutrient contents. The study aimed to know the effect of pumpkin flour substitution on the chemical characteristic of steamed brownies. The pumpkin flour substitution were 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% based on wheat flour weight. The result showed that the pumpkin flour substitution significantly increased the moisture contents, ash contents, and carbohydrate contents of steamed brownies. The highest fat content, protein content, and carbohydrate content showed in those of 20% pumpkin flour substitution. It contained 29,43% of fat content, 8,65% of protein content, and 8,65% of carbohydrate content, respectively.

**Keyword :** Pumpkin Flour, Steamed Pumpkin Brownies, Cemically Charactersitic

### I. PENDAHULUAN

Buah labu kuning memiliki daya simpan yang cukup lama. Buah labu kuning dapat disimpan selama 4 bulan sampai sekian tahun selama tidak terdapat luka atau kerusakan pada bagian permukaan kulitnya. Labu kuning juga kaya akan zat gizi. Kandungan vitamin dan mineral labu kuning cukup beragam meliputi beta karoten, vitamin B1, Vitamin C, kalsium, fosfor, besi, kalium dan natrium [4]. Labu kuning juga kaya akan antioksidan yang memiliki beragam manfaat kesehatan. Manfaat labu kuning diantaranya adalah mencegah serangan jantung, stroke, demam, migrain, diare dan penyakit ginjal

Pemanfaatan labu kuning masih belum maksimal. Masyarakat umumnya masih

memanfaatkan labu kuning sebagai bahan kolak atau bahan dasar kue tradisional. Industri pangan juga memanfaatkan labu kuning menjadi beberapa macam produk olahan seperti dodol, jelly, maupun manisan.

Untuk meningkatkan daya gunanya, labu kuning dapat diolah menjadi tepung. Labu kuning dalam bentuk tepung berpotensi sebagai bahan tambahan atau pengganti pada produk olahan pangan. berbagai macam laporan penelitian telah mengkaji mengenai fortifikasi tepung labu kuning pada pembuatan puding, es krim, cake basah [5], mie [4], roti [7] dan pancake. Salah satu produk bakery yang memungkinkan untuk dilakukan penambahan atau penggantian sebagian tepungnya adalah brownies. Brownies umumnya terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan bahan lainnya seperti telur,

margarin, gula,dan coklat. Brownies memiliki karakteristik yang moist dan tidak memerlukan banyak pengembangan sehingga berpotensi untuk dilakukannya penambahan tepung labu kuning ke dalam <sup>1</sup> formulasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung labu kuning terhadap kandungan gizi brownies kukus. Penambahan tepung labu kuning pada brownies kukus diharapkan dapat meningkatkan kandungan gizinya sehingga dapat menjadi alternatif pemanfaatan bahan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan masyarakat akan penggunaan tepung terigu.

## II. MATERI DAN METODE

### A. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung labu kuning yang berasal dari Kabupaten Jember, gula, tepung terigu protein sedang, telur,margarin, baking powder, NaOH 50%, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 4%, indikator PP, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat, selenium, HgO<sub>2</sub>, heksan dan akuedes.

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah baskom, pengocok telur, food dehydrator, grinder,mixer, inkubator, desikator, tanur, cawan porselein, cawan alumunium, soklet, labu kjeldhal.

### B. Tahapan Penelitian

#### • Pembuatan Tepung Labu Kuning

Labu kuning dikupas kemudian dilakukan proses pengecilan ukuran. Labu kuning direndam dalam larutan natrium metabisulfit selama 23 menit. Setelah itu ditiris dan dikeringkan dengan menggunakan mesin food dehydrator dengan suhu 85°C selama 11 jam [7]. Labu kuning kering selanjutnya ditepungkan dan tepung labu kuning yang dihasilkan kemudian di ayak hingga 100 mesh.

#### • Pembuatan Brownies Kukus

Proses pembuatan brownies kukus dilakukan dengan mencampur bahan kering berupa tepung terigu,tepung labu kuning dan baking powder. Selanjutnya dilakukan pengocokan telur dan gula. Kemudian ditambahkan dengan bahan kering dan margarin yang telah dicairkan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengadukan bahan. Adonan kemudian dituang pada loyang dan dilakukan proses pengukusan.

#### • Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap satu faktor dengan substitusi tepung labu kuning sebesar 0%,20%,40%,60%,80%,dan 100%. Parameter yang akan di analisa meliputi analisa proksimat yang mencakup analisa kadar air dengan oven suhu 105°C selama 3 jam [1] , kadar protein dengan metode mikro kjedahl , kadar lemak dengan metode soxhlet,kadar abu, dan kadar karbohidrat *by different*. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan SPSS dengan ANOVA dan apabila terdapat perbedaan akan dilanjutkan dengan *Duncan New Multiple Range Test* (DNMRT) dengan taraf uji  $\alpha \leq 5\%$ .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa <sup>3</sup> yang dilakukan meliputi analisa proksimat untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap karakteristik kimia dari brownies kukus labu kuning. Parameter yang dianalisa meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat. Hasil analisa proksimat pada brownies kukus labu kuning dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. HASIL ANALISA PROKSIMAT PADA BROWNIES KUKUS LABU KUNING DENGAN BERBAGAI LEVEL SUBSTITUSI TEPUNG LABU KUNING

No	Parameter	Tepung Labu Kuning : Tepung Terigu (%)					
		0 : 100	20 : 80	40 : 60	60 : 40	80 : 20	100 : 0
1	Kadar air	22.91 ± 6.41 <sup>a</sup>	30.01 ± 3.8 <sup>a</sup>	30.59 ± 3.7 <sup>a</sup>	32.65 ± 1.2 <sup>a</sup>	31.14 ± 4.2 <sup>a</sup>	31.79 ± 3.24 <sup>a</sup>
2	Kadar abu	2.01 ± 0.49 <sup>a</sup>	2.08 ± 0.2 <sup>a</sup>	2.37 ± 0.13 <sup>a</sup>	2.52 ± 0.1 <sup>ab</sup>	2.56 ± 0.25 <sup>ab</sup>	3.03 ± 0.13 <sup>b</sup>
3	Kadar lemak	26.64 ± 0.42 <sup>ab</sup>	29.43 ± 1.26 <sup>b</sup>	28.85 ± 1.97 <sup>ab</sup>	27.81 ± 1.61 <sup>ab</sup>	28.32 ± 2.89 <sup>ab</sup>	24.97 ± 0.58 <sup>a</sup>
4	Kadar protein	7.91 ± 2.73 <sup>a</sup>	8.65 ± 3.64 <sup>a</sup>	7.33 ± 2.76 <sup>a</sup>	8.27 ± 3.88 <sup>a</sup>	8.3 ± 1.48 <sup>a</sup>	7.3 ± 3.25 <sup>a</sup>
5	Kadar karbohidrat	7.91 ± 2.73 <sup>b</sup>	8.65 ± 3.64 <sup>a</sup>	7.33 ± 2.76 <sup>ab</sup>	8.27 ± 3.88 <sup>a</sup>	8.3 ± 1.48 <sup>a</sup>	7.3 ± 3.25 <sup>ab</sup>

Keterangan : Angka di dalam tabel merupakan rataan dari 2 ulangan. Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% (huruf kecil)

#### A. Kadar air

Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa substitusi tepung labu kuning pada brownies kukus dapat meningkatkan kadar air pada brownies kukus labu kuning. Nilai rata – rata kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan penambahan tepung labu kuning sebesar 60% dan tepung terigu sebesar 40% sebesar 32,65%. Peningkatan kadar air pada brownies kukus tidak hanya dipengaruhi oleh tepung labu kuning akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan analisa proksimat yang telah dilakukan di [3] tahu bahwa kadar air terendah terdapat pada substitusi tepung labu kuning 20% dan tepung terigu 80% dengan rata – rata kadar air sebesar 30,01% sedangkan nilai tertinggi terdapat pada substitusi tepung labu kuning sebesar 60% dan tepung terigu 40% dengan nilai rata – rata kadar air sebesar 32,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air brownies kukus labu kuning masih belum memenuhi syarat mutu kadar air brownies berdasar SNI yaitu maksimal kadar air sebesar 16.78%.

#### B. Kadar Abu

Semakin tinggi substitusi tepung labu kuning semakin tinggi kadar abu dari brownies kukus labu kuning. Peningkatan kadar abu seiring dengan penambahan jumlah tepung labu kuning terjadi karena tepung labu kuni[2] kaya akan mineral dan vitamin. menurut [3] kandungan mineral dalam labu kuning adalah kalsium (45,00 mg/100g), fosfor (64,00 mg/100g) dan besi (1,40 mg/100g). Nilai kadar abu tepung labu kuning berdasar analisa proksimat adalah sebesar 7,92 %. Nilai kadar abu brownies kukus labu kuning tertinggi berdasar analisa proksimat terdapat pada substitusi tepung labu kuning 100% yaitu sebesar 3,03%. sementara kadar abu brownies kukus labu kuning terendah

berada pada substitusi tepung labu kuning sebesar 20% yaitu nilai kadar abu rata – rata sebesar 2,08%.

#### C. Kadar lemak

Substitusi tepung labu kuning pada brownies kukus menyebabkan penurunan jumlah kadar lemak brownies kukus. Hal ini dapat terjadi karena kandungan lemak tepung labu kuning lebih rendah dibandingkan dengan kandungan lemak pada tepung terigu. Berdasar analisa proksimat kadar lemak tepung labu kuning sebesar 0,2% sedangkan kadar lemak tepung terigu menurut [2] adalah sebesar 0,25% - 0,60%. Pada tabel dapat dilihat bahwa kadar lemak tertinggi pada brownies kukus labu kuning terdapat pada substitusi tepung labu kuning sebesar 20% yaitu 29,43%

#### D. Kadar Protein

Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar protein pada brownies kukus labu kuning seiring dengan semakin bertambahnya jumlah substitusi tepung labu kuning yang ditambahkan. Hal ini dapat terjadi karena kadar protein pada tepung terigu lebih besar dibandingkan dengan kadar protein pada tepung terigu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian [8] yang menyatakan bahwa semakin sedikit konsentrasi penambahan tepung labu kuning maka akan semakin meningkatkan kadar protein pada donat. Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi pada brownies terdapat pada substitusi tepung labu kuning sebesar 20% yaitu sebesar 8,65% dan terendah kadar protein brownies pada substitusi tepung labu kuning 100% yaitu sebesar 7,3% kadar protein.

#### E. Kadar karbohidrat

Substitusi tepung labu kuning pada brownies dapat meningkatkan kadar karbohidrat brownies kukus labu kuning . Hal ini disebabkan karena

tepung labu kuning memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi. berdasar a[3] lisa proksimat diketahui bahwa kadar karbohidrat tepung labu kuning adalah sebesar 85,32%. Pada tabel hasil analisa proksimat pada brownies kukus diketahui bahwa kandungan karbohidrat tertinggi yaitu pada brownies kukus labu kuning dengan substitusi tepung labu kuning 20% yaitu sebesar 8,65% kadar karbohidrat.

- [8] Tamba.M., Ginting S., Limborg.L.N. 2014.Pengaruh substansi tepung labu kuning pada tepung terigu dan konsentrasi ragi pada pembuatan donat. *J.RekayasaPangan dan Pert.*,Vol. 2 No. 2.

#### IV. KESIMPULAN

Substitusi tepung labu kuning pada brownies kukus dapat meningkatkan kandungan gizi pada brownies kukus. Semakin tinggi substitusi tepung labu kuning maka semakin tinggi kadar air, kadar abu,dan kadar karbohidrat pada brownies kukus labu kuning. Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat tertinggi pada brownies kukus terdapat pada brownies kukus dengan substitusi tepung labu kuning sebanyak 20% yaitu masing – masing sebesar 29,43% kadar lemak, 8,65% kadar protein, dan 8,65% kadar karbohidrat.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada P3M Politeknik Negeri Jember yang telah mendanai penelitian ini melalui skema sumber dana PNBP Tahun 2020.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] AOAC 1995 16th ed. AOAC International, Gaithersbug, Maryland.
- [2] Astawan, M. 2008. *Membuat Mi dan Bihun*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- [3] Hendrasty, H. N., 2003. *Tepung Labu Kuning Pembuatan dan Pemanfaatannya*. Kanisius, Yogyakarta.
- [4] Oloyede, F. M., Agbaje, G. O., Obuotor, E. M., & Obisesan, I. O. antioxidant profiles of pumpkin Nuraliza, Adam, A., Fadilah, R. 2016. Pengaruh penambahan labu kuning (*Cucurbita moschata*) dan ubi jalar (*Ipomoea batatas L*) terhadap kecepatan leleh es krim yang dihasilkan. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*. Vol 2, S7-S13.
- [5] Nurjanah, C.E., Lubis, Y.M., Yusriana. 2017. Pembuatan Mie kering dari Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) dengan variasi hidrokoloid. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*. Volume 2, Nomor 3, Agustus 2017.
- [6] Pramudito dan Salim, C. 2020. *Subsitusi Ubi Dengan Labu Kuning Pada Pembuatan Kue Talam*. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- [7] Wahyono, A., Kurniawati, E., Kasut[2]ningati., Park, Kang-Hyun., Kang W W. 2018. Optimasi proses Pembuatan Tepung Labu Kuning Menggunakan Response Methodology Untuk Meningkatkan Aktivitas Antioksidannya. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*. Vol 29(1) 29-38. Doi : 10.6066/jtip.2018.29.1.29.

# Pengaruh Substitusi Tepung Labu Kuning (Cucurbita moschata L) terhadap Nilai Gizi Brownies Kukus Labu Kuning

---

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

---

1	<b>garuda.ristekdikti.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
2	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>2%</b>
3	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
4	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2%</b>

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 2%