

RINGKASAN

PENGARUH PEMBERIAN NAUNGAN KELAPA SAWIT TERHADAP PRESENTASE HIDUP STEK TURNERA DIVISI T PT MUSIRAWAS CITRAHARPINDO Andri, NIM A43222274, Tahun 2026, halaman, Budidaya Tanaman Perkebunan, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Abdurrahman Salim, S.Si., M. Si. (Pembimbing).

Magang dilaksanakan di PT. Perkebunan Musirawas Citraharpindo yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bertempat di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Magang dilaksanakan mulai tanggal 02 Februari sampai dengan 31 Mei 2025.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan baik teori maupun teknis, pengalaman lapang, ketrampilan kerja dalam pengawasan dan administrasi kegiatan kebun serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang di dapat di bangku perkuliahan dengan praktik langsung di lapangan dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Selain itu, untuk mengetahui secara khusus kalibrasi waktu rawat piringan manual dalam satu jalur. Kegiatan magang dilakukan di Area Sei Putih PT. Perkebunan Musirawas Citraharpindo.

Kegiatan magang dilakukan dengan bekerja atau terjun secara langsung di lapangan dari karyawan harian lepas (KHL). pendamping Mandor, Kerani, hingga pendamping Konduktor. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penanaman bunga pukul delapan di perkebunan kelapa sawit sampai hingga manajemen yang dijalankan.

Turnera adalah genus dalam famili tumbuhan berbunga Passifloraceae, sebagian besar berasal dari daerah tropis. Tanaman kecil dengan tinggi sekitar 30–80 cm. Dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit, tanaman *Turnera* berfungsi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, serta membantu pengendalian hama ulat api dan serangga perusak lainnya secara alami.

Adapun penanaman bunga pukul delapan ini dengan menggunakan polybag dan di tanam langsung pada bedengan untuk mengetahui imortalitas bunga pukul delapan.

Pada penelitian ini bunga pukul delapan yang ditanam pada polybag lebih optimal pertumbuhannya dari pada bunga pukul delapan yang ditanam langsung pada bedengan, hal ini juga didukung dengan keadaan iklim yang terjadi pada daerah tersebut.